

Pflege- und Entwicklungskonzept

für das geplante

NSG Schirlheide



NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V

Haus Heidhorn
Westfalenstraße 490
Münster-Hiltrup



Betreuung gepl. NSG Fleiergosse



Betreuung NSG Brüskenheide



„Emsaktionstag“





Schafbeweidung NSG Klatenberge

Weidegebiete Emsaue



www.NABU-Station.de

NABU-Naturschutzstation Münsterland e. V. - Mozilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

http://www.nabu-station.de/ schnabelried Vegetation

WEB SEARCH

Suche

Bild.de Kicker.de YouTube Facebook Spiele Financial Times DE TVmovie.de Wetter E-mail Optionen

NABU-Naturschutzstation Münsterla...

NABU
Naturschutzstation Münsterland

Shop

Termine Spenden Info Adressen Kontakt Presse

{GROUPS}
Name
E-Mail
Anmelden Go

Startseite:

Erfolgreiche Aktionstage - Wir bringen Leben in die Ems



70 aktive Helfer in Saerbeck und 120 in Warendorf-Einen [...mehr]

Erfolgreiche Beweidung der letzten Wacholderheiden



Schafe fördern bedrohte Lebensräume [...mehr]

Mit dem NABU durch den Schmetterlingswald 30.06.10



Am kommenden Sonntag, 4. Juli, lädt die NABU-Naturschutzstation zu einer naturkundlichen Wanderung durch die einzigartige Landschaft der Davert ein. Der 4 km langen Rundweg führt durch...

Folgen Sie uns auf Twitter



Nichts mehr Verpassen!
Führungen, Aktionen,...

Naturschutz geht durch den Magen




Fleisch von den Weideflächen der

Fertig

You saved: 1,485.8 m². All users saved: 115,153,125 m².

Lage der Schirlheide



**Pflege- und
Entwicklungskonzept
gepl. NSG Schirlheide**

**Karte 1:
Lage des geplanten
Naturschutzgebietes**

Stand:
Juli 2009

Bearbeitung:
A. Beuling

0 20 40 60 Meter
1:2500





Pflege- und Entwicklungskonzept gepl. NSG Schirlheide

Karte 2: Vegetation und Biotope

Stand:
Juli 2009

Bearbeitung:
A. Beuling



Wälder und Gehölze

- B-Qt: Betulo-Quercetum typicum (Eichen-Birkenwald, typische Ausbildung)
- B-Qt (e): Betulo-Quercetum typicum; eutrophierter Standort mit flächenhaften Brombeer-Beständen
- B-Qm: Betulo-Quercetum molinietosum (Eichen-Birkenwald, feuchte Ausbildung)
- AK1: Kiefern-mischwald mit heimischen Laubgehölzen
- AK3: Nadelholz-Kiefern-mischwald (unterbaut mit Douglasie)
- AK1 (A): Kiefernbestand aus Aufforstung (Stangenholz)
- BD1: Wallhecke
- BF2: Baumgruppe
- BF3: Einzelbaum
- BB0: Gebüschbestand/Junggehölze
- BB0 (B/E): Gebüschbestand/Junggehölze aus Birke/Erle

Gewässer und Niedermoorgesellschaften

- FD0: Kleingewässer
- FD1: temporäres Gewässer (regelmäßig austrocknend)
- FN0: kleiner Graben
- Rhynchosporion (Schnabelried-Gesellschaft)

Heidegesellschaften

- G-Ct: Genisto-Callunetum typicum (Sandginster-Heide)
- G-Cm: Genisto-Callunetum molinietosum (feuchte Sandginster-Heide), schwach charakterisiert: Molinia caerulea (Pfeifengras) selten, Erica tetralix (Glockenheide) weitestgehend fehlend
- G-Ce: Genisto-Callunetum molinietosum (feuchte Sandginster-Heide), mit Erica tetralix (Glockenheide)
- G-Ct/G-Ce: heterogener Wechsel von Gen.-Callunetum typicum und Gen.-Callunetum molinietosum (reliefbedingt)
- G-Cm/G-Ce: Genisto-Callunetum molinietosum, Wechsel von Beständen mit und ohne Erica tetralix (Glockenheide)
- (o) = Heidebestand mit größeren Anteilen an offenen Bodenstellen
- (ü) = Heidebestand überwiegend überaltert
- (v) = (überwiegend) sehr starke Gehölzentwicklung/verbuschend

Sandmagerrasen und Grünlandgesellschaften

- Fe fi/Ag ca: geschlossene Rotstraußgrasrasen (Agrostis capillaris-Gesellschaft im Wechsel mit lückigen Schafschwingelrasen (Festuca filiformis-Gesellschaft))

- Ag ca: Agrostis capillaris-Gesellschaft (Rotstraußgrasrasen)
- Ag ca (v): Agrostis capillaris-Gesellschaft, starkes Gehölzaufkommen
- A0: mesophiles Grünland, meist ruderalisiert (r), teilweise verbuschend (v), flächenhaft Störzeiger (Goldrute/Lupine)
- HM4: Rasenfläche (regelmäßig gemäht)

Sonstige

- LB0: Flächenhafte Hochstaudenflur (v.a. Brennnessel, Urtica dioica)
- HA0: Ackerfläche
- unbefestigter Weg
- Verbreitung Goldrute (Solidago canadensis)
- Verbreitung Lupine (Lupinus polyphyllus)

1 Nummer der Untersuchungsfläche für Artenliste (siehe Vegetationstabelle und Erläuterungstext)

Grenze des Untersuchungsgebietes

Pflanzenarten:


In Klammern: Gefährdung nach Rote Liste NRW (LÖBF NRW 1999) (NRW/Westfälische Bucht); Gefährdungsstatus: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste; * = nicht gefährdet; N = von Naturschutzmaßnahmen abhängig

Av: *Agrostis vinealis* (Sand-Straußgras) (V)
 Ap: *Aira praecox* (Früher Schmielenhafer) (3/3)
 Ca: *Carex arenaria* (Sand-Segge) (3/3)
 Cf: *Carex flava* agg. (cf. *C. demissa*, Aufsteigende Gelb-Segge) (V)
 Cn: *Carex nigra* (Braun-Segge) (V)
 Dd: *Danthonia decumbens* (Dreizahn) (3/3)
 Di: *Drosera intermedia* (Mittlerer Sonnentau) (3N/3N)
 Dr: *Drosera rotundifolia* (Rundblättriger Sonnentau) (3N/2N)
 Eh: *Epipactis helleborine* (Breitblättrige Stendelwurz) (*/*)
 Ff: *Festuca filiformis* (Haar-Schwingel) (V)
 Fm: *Filago minima* (Kleines Filzkraut) (3/3)
 Gp: *Genista pilosa* (Haar-Ginster) (3/3)
 Hp: *Hieracium pilosella* (Mausohr-Habichtskraut) (V)
 Hv: *Hydrocotyle vulgaris* (Wassernabel) (*/*)
 Jm: *Jasione montana* (Berg-Sandglockchen) (3/3)
 Js: *Juncus squarrosus* (Sparrige Binse) (3N/*N)
 Li: *Lycopodiella inundata* (Sumpf-Bärlapp) (2/3N)
 Ns: *Nardus stricta* (Borstgras) (3/3)
 Op: *Ornithopus perpusillus* (Kleiner Vogelfuß) (*/*)
 Rf: *Ranunculus flammula* (Brennender Hahnenfuß) (V)
 Rfu: *Rhynchospora fusca* (Braunes Schnabelried) (2/2)
 Sr: *Salix repens* (Kriechweide) (3/3)
 Sm: *Spergula morisonii* (Frühlings-Spörgel) (3/3)
 Tn: *Teesdalia nudicaulis* (Bauernsenf) (3/3)
 Vo: *Veronica officinalis* (Wald-Ehrenpreis) (*/*)
 Vs: *Veronica scutellata* (Schild-Ehrenpreis) (3/*N)

Gefährdungsstatus:

- Art landesweit und/oder im Naturraum Westfälische Bucht stark gefährdet (RL 2)
- Art landesweit und/oder im Naturraum Westfälische Bucht gefährdet (RL 3)
- Art der Vorwarnliste
- sonstige bemerkenswerte oder regional seltene Art (landesweit und/oder im Naturraum Westfälische Bucht ungefährdet)

- Grenze Untersuchungsgebiet
- Grenze der Vegetationseinheiten (s. Karte 2)



Pflege- und Entwicklungskonzept gepl. NSG Schirleide

Karte 3:
Verbreitung gefährdeter
und regional seltener
Pflanzenarten

Stand:
Juli 2009

Bearbeitung:
A. Beutling

0 20 40 60 Meter
1:2500





**Schnabelreid-Gesellschaft
(FFH-Lebensraumtyp)**

Zauneidechse (Anhangsart FFH-RL)





**Geplante Maßnahmen für
2010 im Rahmen des
ELER-Antrages**

(Erläuterungen:
s. Tabelle und Text)

0 10 20 30 40 50 Meter
1:2000



**Entwicklungsmaßnahmen
im gepl. NSG Schirlheide**


11 Abbau und Neuerrichtung
eines Weidezauns

Einbau
eines Tores

12 eine große Infotafel
im Bereich des
Picknickplatzes

Einbau eines
Tores

11 Abbau und Neuerrichtung
eines Weidezauns





**Geplante Maßnahmen für
2010 im Rahmen des
ELER-Antrages**

(Erläuterungen:
s. Tabelle und Text)

0 10 20 30 40 50 Meter
1:2000



**Entwicklungsmaßnahmen
im gepl. NSG Schirlheide**


11 Abbau und Neuerrichtung
eines Weidezauns

Einbau
eines Tores

12 eine große Infotafel
im Bereich des
Picknickplatzes

Einbau eines
Tores

11 Abbau und Neuerrichtung
eines Weidezauns





**Geplante Maßnahmen für
2010 im Rahmen des
ELER-Antrages**

(Erläuterungen:
s. Tabelle und Text)

0 10 20 30 40 50 Meter
1:2000



**Entwicklungsmaßnahmen
im gepl. NSG Schirlheide**

11 Abbau und Neuerrichtung
eines Weidezauns

Einbau
eines Tores

12 eine große Infotafel
im Bereich des
Picknickplatzes

Einbau eines
Tores

11 Abbau und Neuerrichtung
eines Weidezauns

